Formelsammlung Geometrie

Unterstützen Sie meine Arbeit durch eine Spende.
http://www.fersch.de
Jeder Spender erhält eine verbesserte und erweiterte Formelsammlung.

©Klemens Fersch

10. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

2 Geometrie **2**
- 2.1 Grundlagen . . . 2
  - 2.1.1 Definitionen . . . 2
  - 2.1.2 Strahlensatz (Vierstreckensatz) . . . 3
- 2.2 Dreieck . . . 4
  - 2.2.1 Eigenschaften des Dreiecks . . . 4
  - 2.2.2 Besondere Linien im Dreieck . . . 4
  - 2.2.3 Allgemeines Dreieck . . . 6
  - 2.2.4 Gleichseitiges Dreieck . . . 7
  - 2.2.5 Gleichschenkliges Dreieck . . . 8
  - 2.2.6 Rechtwinkliges Dreieck . . . 8
  - 2.2.7 Gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck . . . 9
  - 2.2.8 Kongruenzsätze . . . 10
  - 2.2.9 Pythagoras - Höhensatz - Kathetensatz . . . 11
- 2.3 Viereck . . . 13
  - 2.3.1 Allgemeines Viereck . . . 13
  - 2.3.2 Quadrat . . . 13
  - 2.3.3 Rechteck . . . 14
  - 2.3.4 Parallelogramm . . . 15
  - 2.3.5 Raute . . . 16
  - 2.3.6 Drachen . . . 17
  - 2.3.7 Allgemeines Trapez . . . 18
  - 2.3.8 Gleichschenkliges Trapez . . . 18
  - 2.3.9 Rechtwinkliges Trapez . . . 19
- 2.4 Polygone (n-Ecken) . . . 20
  - 2.4.1 Regelmäßiges n-Eck . . . 20
  - 2.4.2 Sechseck . . . 20
- 2.5 Kreis . . . 21
  - 2.5.1 Kreis . . . 21
  - 2.5.2 Kreissektor (Grad) . . . 21
  - 2.5.3 Kreissektor (Bogenmaß) . . . 21
  - 2.5.4 Kreisring . . . 22
- 2.6 Stereometrie . . . 23
  - 2.6.1 Prisma . . . 23
  - 2.6.2 Würfel . . . 23
  - 2.6.3 Quader . . . 24
  - 2.6.4 Pyramide . . . 24
  - 2.6.5 Kreiszylinder . . . 27
  - 2.6.6 Hohlzylinder . . . 28

2.6.7 Kreiskegel . . . 28
2.6.8 Kegelstumpf . . . 29
2.6.9 Kugel . . . 31
2.7 Trigonometrie . . . 32
2.7.1 Gradmaß - Bogenmaß . . . 32
2.7.2 Definition . . . 32
2.7.3 Quadrantenregel . . . 34
2.7.4 Umrechnungen . . . 36
2.7.5 Rechtwinkliges Dreieck . . . 37
2.7.6 Sinussatz . . . 37
2.7.7 Kosinussatz . . . 38
2.7.8 Kongruenzsätze - Berechnungen am Dreieck . . . 39


2 Geometrie

2.1 Grundlagen

2.1.1 Definitionen

Strecke $[AB]$

Gerade Linie die durch 2 Endpunkte begrenzt wird.




Länge einer Strecke $\overline{AB}$

Entfernung zwischen den Punkten A und B.

$\overline{AB} = 3cm$


Gerade AB

Unbegrenzte gerade Linie durch 2 Punkte.




Halbgerade - Strahl $[AB$

Einseitig begrenzte gerade Linie.



Winkel


Zwei von einem Punkt (Scheitel) ausgehenden Halbgeraden (Schenkel) schließen einen Winkel ein.
$\alpha = \measuredangle ABC$
Drehsinn entgegen des Uhrzeigersinns = positiver Winkel
Drehsinn im Uhrzeigersinn = negativer Winkel
spitzer Winkel: $0° < \alpha < 90°$
rechter Winkel: $\alpha = 90°$
stumpfer Winkel: $90° < \alpha < 180°$
gestreckter Winkel: $\alpha = 180°$
überstumpfer Winkel: $180° < \alpha < 360°$
Vollwinkel: $\alpha = 360°$



B Scheitelpunkt
$[BA, [BC$ Schenkel
$\alpha = \measuredangle ABC \qquad \beta = \measuredangle CBA$

Winkel an sich schneidenden Geraden


Scheitelwinkel (Gegenwinkel) sind gleich groß.
Nebenwinkel ergänzen sich zu 180°.



Scheitelwinkel: $\alpha_1 = \alpha_2; \beta_1 = \beta_2$
Nebenwinkel: $\alpha_1 + \beta_1 = 180°; \alpha_2 + \beta_2 = 180°$


Winkel an parallelen Geraden

Stufenwinkel (F-Winkel) und Wechselwinkel (Z-Winkel) sind gleich groß. Nachbarwinkel (E-Winkel) ergänzen sich zu 180°.



$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$
$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$
$\alpha + \beta = 180°$
Stufenwinkel: $\alpha_1 = \alpha_3; \beta_1 = \beta_3$
Wechselwinkel: $\alpha_2 = \alpha_3; \beta_2 = \beta_3$
Nachbarwinkel: $\alpha_3 + \beta_2 = 180°; \alpha_2 + \beta_3 = 180°$

2.1.2 Strahlensatz (Vierstreckensatz)



$\overline{AB} \parallel \overline{A'B'} \Leftrightarrow$

$$\frac{\overline{ZA'}}{\overline{ZA}} = \frac{\overline{ZB'}}{\overline{ZB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

$$\frac{\overline{ZA}}{\overline{AA'}} = \frac{\overline{ZB}}{\overline{BB'}}$$

2.2 Dreieck

2.2.1 Eigenschaften des Dreiecks

Winkel- und Seitenbeziehungen

- Innenwinkelsumme: $\alpha + \beta + \gamma = 180°$
- Außenwinkelsumme: $\alpha' + \beta' + \gamma' = 360°$
- $\gamma' = \alpha + \beta; \beta' = \alpha + \gamma; \alpha' = \beta + \gamma;$
- Dreiecksungleichung:

Die Summe zweier Dreiecksseiten ist größer als die dritte Seite.

$a + b > c \quad a + c > b \quad b + c > a$

- Der längeren von zwei Seiten liegt der größere Winkel gegenüber.

$a > b \Rightarrow \alpha > \beta \qquad a < b \Rightarrow \alpha < \beta$

$a > c \Rightarrow \alpha > \gamma \qquad a < c \Rightarrow \alpha < \gamma$


$b > c \Rightarrow \beta > \gamma \qquad b < c \Rightarrow \beta < \gamma$

- Gleichlangen Seiten liegen gleiche Winkel gegenüber.

$a = b \Rightarrow \alpha = \beta$

$a = c \Rightarrow \alpha = \gamma$

$b = c \Rightarrow \beta = \gamma$




[hier klicken]

2.2.2 Besondere Linien im Dreieck

Mittelsenkrechte

Alle Punkte auf einer Mittelsenkrechte haben von zwei Eckpunkten die gleiche Entfernung. Die Mittelsenkrechten schneiden sich im Umkreismittelpunkt. Der Umkreismittelpunkt hat von den drei Eckpunkten des Dreiecks die gleiche Entfernung.

Umkreisradius: $r_u = \frac{a}{2 \cdot \sin\alpha} = \frac{b}{2 \cdot \sin\beta} = \frac{c}{2 \cdot \sin\gamma}$



Mittelsenkrechte

Höhe

Das Lot von einem Eckpunkt des Dreiecks auf die gegenüberliegende Dreiecksseite. Höhen schneiden sich im Höhenschnittpunkt.

Höhen berechnen:

$h_a = c \cdot \sin\beta$

$h_b = a \cdot \sin\gamma$

$h_c = b \cdot \sin\alpha$


Fläche des Dreicks:

$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_a$

$A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot h_b$

$A = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$

$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$



Höhen

Winkelhalbierende

Alle Punkte auf einer Winkelhalbierenden haben zu den Schenkeln den gleichen Abstand. Die Winkelhalbierenden schneiden sich im Inkreismittelpunkt. Der Inkreismittelpunkt hat von den drei Seiten des Dreiecks den gleichen Abstand.


Inkreisradius:

$$\rho = r_i = \frac{2 \cdot A}{U} = \frac{2 \cdot A}{a+b+c}$$

$\delta_1 = 180° - \beta - \frac{\alpha}{2}$ $\quad w_\alpha = \frac{c \cdot \sin\beta}{\sin\delta_1}$

$\delta_2 = 180° - \frac{\beta}{2} - \gamma$ $\quad w_\beta = \frac{a \cdot \sin\gamma}{\sin\delta_2}$

$\delta_3 = 180° - \alpha - \frac{\gamma}{2}$ $\quad w_\gamma = \frac{b \cdot \sin\alpha}{\sin\delta_3}$




Winkelhalbierende

Seitenhalbierende

Strecke vom einem Eckpunkt des Dreiecks zum Mittelpunkt der gegenüberliegenden Seite. Die Seitenhalbierenden schneiden sich im Schwerpunkt. Der Schwerpunkt teilt die Seitenhalbierenden im Verhältnis 2:1.


$s_a = \frac{1}{2}\sqrt{2(b^2+c^2)-a^2}$
$s_b = \frac{1}{2}\sqrt{2(a^2+c^2)-b^2}$
$s_c = \frac{1}{2}\sqrt{2(a^2+b^2)-c^2}$



Seitenhalbierende

[hier klicken]

2.2.3 Allgemeines Dreieck



Eigenschaften

- Innenwinkelsumme: 180°

$\alpha + \beta + \gamma = 180°$

Fläche Grundline-Höhe

$A = \frac{g \cdot h}{2}$

g	Grundlinie	m
h	Höhe	m
A	Fläche	m^2

$g = \frac{A \cdot 2}{h}$ $h = \frac{A \cdot 2}{g}$

Fläche-Winkel

$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot sin(\gamma)$

b	Länge der Seite	m
a	Länge der Seite	m
γ	Winkel Gamma	°
A	Fläche	m^2


Umfang

$U = a + b + c$

c	Länge der Seite	m
b	Länge der Seite	m
a	Länge der Seite	m
U	Umfang	m

[$A = \frac{g \cdot h}{2}$][$g = \frac{A \cdot 2}{h}$][$h = \frac{A \cdot 2}{g}$][$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot sin(\gamma)$][$U = a + b + c$]

2.2.4 Gleichseitiges Dreieck



Eigenschaften

- alle drei Seiten sind gleich lang
- Innenwinkelsumme: 180°
- alle Winkel sind gleich groß: 60°
- drei Symmetrieachsen
- Besonderen Linien im Dreieck fallen zusammen

$a = b = c$
$\alpha + \beta + \gamma = 180°$
$\alpha = \beta = \gamma = 60°$
Symmetrieachsen: s_1, s_2, s_3

Flächeim gleichseitigen Dreieck

$A = \frac{a^2}{4} \cdot \sqrt{3}$

a	Seite a	m
A	Fläche	m^2

$a = \sqrt{\frac{A \cdot 4}{\sqrt{3}}}$

Höhe im gleichseitigen Dreieck


$h = \frac{a}{2} \cdot \sqrt{3}$

h	Höhe	m
a	Grundlinie a	m

$a = \frac{h \cdot 2}{\sqrt{3}}$

[$A = \frac{a^2}{4} \cdot \sqrt{3}$][$a = \sqrt{\frac{A \cdot 4}{\sqrt{3}}}$][$h = \frac{a}{2} \cdot \sqrt{3}$][$a = \frac{h \cdot 2}{\sqrt{3}}$]

2.2.5 Gleichschenkliges Dreieck




Eigenschaften

- zwei Seiten sind gleich lang (Schenkel)
- Innenwinkelsumme: 180°
- zwei Winkel sind gleich groß (Basiswinkel)
- eine Symmetrieachse

Schenkel: $a = b$
Basis: c
Basiswinkel: $\alpha = \beta$
$\alpha + \beta + \gamma = 180°$
$\gamma = 180° - 2 \cdot \alpha \quad \gamma = 180° - 2 \cdot \beta$
$\alpha = \frac{180° - \gamma}{2} \quad \beta = \frac{180° - \gamma}{2}$
Symmetrieachse: s_1

2.2.6 Rechtwinkliges Dreieck



Eigenschaften

- Innenwinkelsumme: 180°
- ein Winkel ist 90°

$\alpha + \beta + \gamma = 180°$
$\gamma = 90°$

Fläche

$A = \frac{a \cdot b}{2}$

b	Ankathete zu α	m
a	Gegenkathete zu α	m
A	Fläche	m^2

$a = \frac{A \cdot 2}{b}$ $b = \frac{A \cdot 2}{a}$

Phytagoras

$a^2 + b^2 = c^2$

a	Gegenkathete zu α	m
b	Ankathete zu α	m
c	Hypotenuse	m

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$ $a = \sqrt{c^2 - b^2}$ $b = \sqrt{c^2 - a^2}$

Höhensatz

$h^2 = p \cdot q$

q	Hypotenusenabschnitt	m
p	Hypotenusenabschnitt	m
h	Höhe	m

$h = \sqrt{p \cdot q}$ $q = \frac{h^2}{p}$ $p = \frac{h^2}{q}$

Kathetensatz


$a^2 = c \cdot p \qquad b^2 = c \cdot q$

p	Hypotenusenabschnitt	m
c	Hypotenuse	m
a	Gegenkathete zu α	m

$a = \sqrt{c \cdot p}$ $c = \frac{a^2}{p}$ $p = \frac{a^2}{c}$

[$A = \frac{a \cdot b}{2}$][$a = \frac{A \cdot 2}{b}$][$b = \frac{A \cdot 2}{a}$][$a^2 + b^2 = c^2$][$c = \sqrt{a^2 + b^2}$][$a = \sqrt{c^2 - b^2}$][$b = \sqrt{c^2 - a^2}$][$h^2 = p \cdot q$][$h = \sqrt{p \cdot q}$][$q = \frac{h^2}{p}$][$p = \frac{h^2}{q}$][$a^2 = c \cdot p \qquad b^2 = c \cdot q$][$a = \sqrt{c \cdot p}$][$c = \frac{a^2}{p}$][$p = \frac{a^2}{c}$]

2.2.7 Gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck



Eigenschaften

- zwei Seiten sind gleich lang (Schenkel)
- Innenwinkelsumme: 180°
- ein Winkel ist 90°
- Innenwinkelsumme: 180°
- zwei Winkel sind 45° (Basiswinkel)
- eine Symmetrieachse

Schenkel: $a = b$
Basis: c
Innenwinkelsumme: 180°
Basiswinkel: $\alpha = \beta = 45°$
Symmetrieachse: s_1


[$A = \frac{a \cdot b}{2}$][$a = \frac{A \cdot 2}{b}$][$b = \frac{A \cdot 2}{a}$][$a^2 + b^2 = c^2$][$c = \sqrt{a^2 + b^2}$][$a = \sqrt{c^2 - b^2}$][$b = \sqrt{c^2 - a^2}$][$h^2 = p \cdot q$][$h = \sqrt{p \cdot q}$][$q = \frac{h^2}{p}$][$p = \frac{h^2}{q}$][$a^2 = c \cdot p \qquad b^2 = c \cdot q$][$a = \sqrt{c \cdot p}$][$c = \frac{a^2}{p}$][$p = \frac{a^2}{c}$]

2.2.8 Kongruenzsätze

Seite - Seite - Seite (SSS)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in den drei Seiten übereinstimmen.

Seite	Seite	Seite
a	b	c




$a = 2,2cm \qquad b = 3.6cm \qquad c = 4cm$

Seite - Winkel - Seite (SWS)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen.

Seite	Winkel	Seite
a	β	c
a	γ	b
b	α	c




$b = 3.6cm \qquad c = 4cm \qquad \alpha = 33°$

Winkel - Seite - Winkel (WSW,WWS)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Winkeln und einer Seite übereinstimmen.

Winkel	Seite	Winkel
α	c	β
α	b	γ
β	a	γ

Winkel	Winkel	Seite
α	β	a
α	β	b
α	γ	a
α	γ	c
β	γ	b
β	γ	c




$c = 4cm \qquad \alpha = 33° \qquad \beta = 63°$

Seite - Seite - Winkel (SsW)

Zwei Dreiecke sind kongruent, wenn sie in zwei Seiten und dem der längeren Seite gegenüber liegenden Winkel (Gegenwinkel) übereinstimmen.


Seite	Seite	Winkel	
a	b	α	$a > b$
a	b	β	$b > a$
a	c	α	$a > c$
a	c	γ	$c > a$
b	c	β	$b > c$
b	c	γ	$c > b$



$a = 2,2cm$ $b = 3,6cm$ $\beta = 63°$

[hier klicken]

2.2.9 Pythagoras - Höhensatz - Kathetensatz



Pythagoras

Die Katheten sind die am rechten Winkel anliegenden Seiten. Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber. Die Summe der Kathetenquadrate ist gleich dem Hypotenusenquadrat.

$\gamma = 90°$ Katheten a und b Hypotenuse c

$a^2 + b^2 = c^2$

$\triangle A_1B_1C_1$

$\gamma_1 = 90^\circ$ Katheten a_1 und b_1 Hypotenuse c_1

$a_1^2 + b_1^2 = c_1^2$

$c_1 = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}$ $a_1 = \sqrt{c_1^2 - b_1^2}$ $b_1 = \sqrt{c_1^2 - a_1^2}$

$\triangle A_2B_2C_2$

$\beta_2 = 90^\circ$ Katheten a_2 und c_2 Hypotenuse b_2

$a_2^2 + c_2^2 = b_2^2$

$b_2 = \sqrt{a_2^2 + c_2^2}$ $a_2 = \sqrt{b_2^2 - c_2^2}$ $c_2 = \sqrt{b_2^2 - a_2^2}$

$\triangle A_3B_3C_3$

$\alpha_3 = 90^\circ$ Katheten b_3 und c_3 Hypotenuse a_3

$a_3^2 + b_3^2 = c_3^2$

$a_3 = \sqrt{b_3^2 + c_3^2}$ $b_3 = \sqrt{a_3^2 - c_3^2}$ $c_3 = \sqrt{a_3^2 - b_3^2}$

Kathetensatz

Die Höhe h teilt die Hypotenuse in zwei Hypotenusenabschnitte.
Die Kathete im Quadrat ist gleich dem Produkt aus dem zugehörigen Hypotenusenabschnitt und der Hypotenuse.
$\gamma = 90°$ $c = p + q$
Katheten a und b Hypotenuse c
Hypotenusenabschnitt p und q
$a^2 = c \cdot p$ $b^2 = c \cdot q$

$\triangle A_1B_1C_1$
$\gamma_1 = 90°$ Katheten a_1 und b_1 Hypotenuse c_1
Hypotenusenabschnitte p_1 und q_1 $c_1 = p_1 + q_1$
$a_1^2 = c_1 \cdot p_1$ $a_1 = \sqrt{c_1 \cdot p_1}$ $c_1 = \frac{a_1^2}{p_1}$ $p_1 = \frac{a_1^2}{c_1}$
$b_1^2 = c_1 \cdot q_1$ $b_1 = \sqrt{c_1 \cdot q_1}$ $c_1 = \frac{b_1^2}{q_1}$ $q_1 = \frac{b_1^2}{c_1}$
$\triangle A_2B_2C_2$
$\beta_2 = 90°$ Katheten a_2 und c_2 Hypotenuse b_2
Hypotenusenabschnitte p_2 und q_2 $b_2 = p_2 + q_2$
$a_2^2 = b_2 \cdot p_2$ $a_2 = \sqrt{b_2 \cdot p_2}$ $b_2 = \frac{a_2^2}{p_2}$ $p_2 = \frac{a_2^2}{b_2}$
$c_2^2 = b_2 \cdot q_2$ $c_2 = \sqrt{b_2 \cdot q_2}$ $b_2 = \frac{c_2^2}{q_2}$ $q_2 = \frac{c_2^2}{b_2}$
$\triangle A_3B_3C_3$
$\alpha_3 = 90°$ Katheten b_3 und c_3 Hypotenuse a_3
Hypotenusenabschnitte p_3 und q_3 $a_3 = p_3 + q_3$
$b_3^2 = a_3 \cdot p_3$ $b_3 = \sqrt{a_3 \cdot p_3}$ $a_3 = \frac{b_3^2}{p_3}$ $p_3 = \frac{b_3^2}{a_3}$
$c_3^2 = a_3 \cdot q_3$ $c_3 = \sqrt{a_3 \cdot q_3}$ $a_3 = \frac{c_3^2}{q_3}$ $q_3 = \frac{c_3^2}{a_3}$


Höhensatz

Die Höhe h teilt die Hypotenuse in zwei Hypotenusenabschnitte.
Die Höhe im Quadrat ist gleich dem Produkt der Hypotenusenabschnitte.
$\gamma = 90°$ $c = p + q$
Hypotenusenabschnitte p und q
$h^2 = p \cdot q$


$\triangle A_1B_1C_1$
$\gamma_1 = 90°$ Katheten a_1 und b_1 Hypotenuse c_1
Hypotenusenabschnitte p_1 und q_1 $c_1 = p_1 + q_1$
$h_1^2 = p_1 \cdot q_1$ $h_1 = \sqrt{p_1 \cdot q_1}$ $p_1 = \frac{h_1^2}{q_1}$ $q_2 = \frac{h_1^2}{p_1}$
$\triangle A_2B_2C_2$
$\beta_2 = 90°$ Katheten a_2 und c_2 Hypotenuse b_2
Hypotenusenabschnitte p_2 und q_2 $b_2 = p_2 + q_2$
$h_2^2 = p_2 \cdot q_2$ $h_2 = \sqrt{p_2 \cdot q_2}$ $p_2 = \frac{h_2^2}{q_2}$ $q_2 = \frac{h_2^2}{p_2}$
$\triangle A_3B_3C_3$
$\alpha_3 = 90°$ Katheten b_3 und c_3 Hypotenuse a_3
Hypotenusenabschnitte p_3 und q_3 $a_3 = p_3 + q_3$
$h_3^2 = p_3 \cdot q_3$ $h_3 = \sqrt{p_3 \cdot q_3}$ $p_3 = \frac{h_3^2}{q_3}$ $q_3 = \frac{h_3^2}{p_3}$

2.3 Viereck

2.3.1 Allgemeines Viereck



konvex




konkav

Allgemeines Viereck

- Innenwinkelsumme: 360°
- Konvexes Viereck:
- Diagonalen schneiden sich innerhalb des Vierecks
- alle Winkel sind kleiner als 180°
- Konkaves Viereck:
- Diagonalen schneiden sich außerhalb des Vierecks
- ein Winkel ist größer als 180°

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
Diagonale: $\overline{AC} = e \quad \overline{BD} = f$

2.3.2 Quadrat



Eigenschaften des Quadrats

- Innenwinkelsumme: 360°
- alle Seiten sind gleich lang
- gegenüberliegende Seiten sind parallel
- alle Innenwinkel sind rechte Winkel
- Diagonalen sind gleich lang und halbieren einander
- Diagonalen sind senkrecht zueinander
- vier Symmetrieachsen
- Punktsymmetrisch

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
$a = b = c = d$
$a \| c \quad b \| d$
$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 90°$
Diagonale: $d = e = f$
$e \perp f$

Fläche des Quadrats

$A = a^2$

a	Seite	m
A	Fläche	m^2

$a = \sqrt{A}$

Umfang des Quadrats

$U = 4 \cdot a$

a	Seite	m
U	Umfang	m

$a = \frac{U}{4}$

Diagonale des Quadrats


$d = a \cdot \sqrt{2}$

a	Seite	m
d	Diagonale	m

$a = \frac{d}{\sqrt{2}}$

[$A = a^2$][$a = \sqrt{A}$][$U = 4 \cdot a$][$a = \frac{U}{4}$][$d = a \cdot \sqrt{2}$][$a = \frac{d}{\sqrt{2}}$]

2.3.3 Rechteck



Eigenschaftgen des Rechtecks

- Innenwinkelsumme: 360°
- gegenüberliegende Seiten sind gleich lang
- gegenüberliegende Seiten sind parallel
- alle Innenwinkel sind rechte Winkel
- Diagonalen sind gleich lang und halbieren einander
- zwei Symmetrieachsen
- Punktsymmetrisch

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
$a = c \quad b = d$
$a \| c \quad b \| d$
$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 90°$
Diagonale: $d = e = f$
Symmetrieachsen: s_1, s_2
Punktsymmetrisch zu Z

Fläche des Rechtecks

$A = a \cdot b$

b	Breite	m
a	Länge	m
A	Fläche	m^2

$a = \frac{A}{b} \quad b = \frac{A}{a}$

Umfang des Rechtecks

$U = 2 \cdot a + 2 \cdot b$

b	Breite	m
a	Länge	m
U	Umfang	m

$a = \frac{U-2 \cdot b}{2} \quad b = \frac{U-2 \cdot a}{2}$

Diagonalen des Rechtecks


$d = \sqrt{a^2 + b^2}$

b	Breite	m
a	Länge	m
d	Diagonale	m

$b = \sqrt{d^2 - a^2} \quad a = \sqrt{d^2 - b^2}$

[$A = a \cdot b$][$a = \frac{A}{b}$][$b = \frac{A}{a}$][$U = 2 \cdot a + 2 \cdot b$][$a = \frac{U-2 \cdot b}{2}$][$b = \frac{U-2 \cdot a}{2}$][$d = \sqrt{a^2 + b^2}$][$b = \sqrt{d^2 - a^2}$][$a = \sqrt{d^2 - b^2}$]

2.3.4 Parallelogramm



Eigenschaften des Parallelogramms

- Innenwinkelsumme: 360°
- gegenüberliegende Seiten sind gleich lang
- gegenüberliegende Seiten sind parallel
- gegenüberliegende Winkel sind gleich groß
- Nachbarwinkel ergeben zusammen 180°
- Diagonalen halbieren einander
- Punktsymmetrie

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
$a = c \quad b = d$
$a \| c \quad b \| d$
$\alpha + \delta = 180° \quad \gamma + \beta = 180°$
$\alpha = \gamma \quad \beta = \delta$
Punktsymmetrisch zu Z

Fläche des Parallelogramms

$A = g \cdot h$

h	Höhe	m
g	Grundlinie	m
A	Fläche	m^2

$g = \frac{A}{h} \quad h = \frac{A}{g}$

Umfang des Parallelogramms


$U = 2 \cdot a + 2 \cdot b$

b	Breite	m
a	Länge	m
U	Umfang	m

$a = \frac{U-2 \cdot b}{2} \quad b = \frac{U-2 \cdot a}{2}$

[$A = g \cdot h$][$g = \frac{A}{h}$][$h = \frac{A}{g}$]

2.3.5 Raute



Raute (Rhombus)

- Innenwinkelsumme: 360°
- alle Seiten sind gleich lang
- gegenüberliegende Seiten sind parallel
- gegenüberliegende Winkel sind gleich groß
- Nachbarwinkel ergeben zusammen 180°
- Diagonalen sind senkrecht zueinander
- Diagonalen halbieren einander
- zwei Symmetrieachsen
- Punktsymmetrisch

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
$a = c = b = d$
$a \| c \quad b \| d$
$\alpha + \delta = 180° \quad \gamma + \beta = 180°$
$\alpha = \gamma \quad \beta = \delta$
Symmetrieachsen: s_1, s_2
Punktsymmetrisch zu Z

Fläche der Raute


$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$

f	Diagonale f	m
e	Diagonale e	m
A	Fläche	m^2

$e = \frac{2 \cdot A}{f} \quad f = \frac{2 \cdot A}{e}$

[$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$][$e = \frac{2 \cdot A}{f}$][$f = \frac{2 \cdot A}{e}$]

2.3.6 Drachen



Fläche des Drachenvierecks

- Innenwinkelsumme: 360°
- zwei Paar benachbarter Seiten sind gleich lang
- zwei Winkel sind gleich
- eine Diagonale halbiert die andere
- eine Symmetrieachse

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
$a = d \quad b = c$
$a \| c \quad b \| d$
$\beta = \delta$
Symmetrieachse: s_1

Fläche der Raute


$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$

f	Diagonale f	m
e	Diagonale e	m
A	Fläche	m^2

$e = \frac{2 \cdot A}{f} \quad f = \frac{2 \cdot A}{e}$

[$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$][$e = \frac{2 \cdot A}{f}$][$f = \frac{2 \cdot A}{e}$]

2.3.7 Allgemeines Trapez



Eigenschaften des Allgemeinen Trapezes

- Innenwinkelsumme: 360°
- zwei Seiten sind parallel
- Nachbarwinkel ergeben jeweils zusammen 180°

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
$a \| c$
$\alpha + \delta = 180°$ $\gamma + \beta = 180°$

Flächeninhalt Trapez


$A = \frac{a+c}{2} \cdot h$

c	Grundlinie c	m
a	Grundlinie a	m
h	Höhe	m
A	Fläche	m^2

$a = \frac{2 \cdot A}{h} - c$ $c = \frac{2 \cdot A}{h} - a$ $h = \frac{2 \cdot A}{a+c}$

[$A = \frac{a+c}{2} \cdot h$][$a = \frac{2 \cdot A}{h} - c$][$c = \frac{2 \cdot A}{h} - a$][$h = \frac{2 \cdot A}{a+c}$]

2.3.8 Gleichschenkliges Trapez




Eigenschaften Gleichschenkliges Trapez

- Innenwinkelsumme: 360°
- zwei Seiten sind parallel
- zwei Seiten sind gleich lang
- je zwei Winkel sind gleich groß
- eine Symmetrieachse
- Diagonalen sind gleich lang
- eine Symmetrieachse

$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
$a \| c$
$d = b$
$\alpha + \delta = 180°$ $\gamma + \beta = 180°$
$\alpha = \beta$ $\gamma = \delta$

[$A = \frac{a+c}{2} \cdot h$][$a = \frac{2 \cdot A}{h} - c$][$c = \frac{2 \cdot A}{h} - a$][$h = \frac{2 \cdot A}{a+c}$]

2.3.9 Rechtwinkliges Trapez




$A = \frac{a+c}{2} \cdot h$

c	Grundlinie c	m
a	Grundlinie a	m
h	Höhe	m
A	Fläche	m^2

[$A = \frac{a+c}{2} \cdot h$][$a = \frac{2 \cdot A}{h} - c$][$c = \frac{2 \cdot A}{h} - a$][$h = \frac{2 \cdot A}{a+c}$]


2.4 Polygone (n-Ecken)

2.4.1 Regelmäßiges n-Eck



Seitenlänge n-Eck: $a = 2 \cdot r \sin \frac{\mu}{2}$
Mittelpunktswinkel: $\mu = \frac{360°}{n}$
Innenwinkel: $\alpha = 180° - \mu$
Fläche: $A = n \cdot A_D = \frac{n}{2} \cdot r^2 \cdot \sin \mu$

2.4.2 Sechseck



Seitenlänge 6-Eck: $a = r$
Mittelpunktswinkel: $\mu = \frac{360°}{6} = 60°$
Innenwinkel: $\alpha = 180° - 60° = 120°$


$A = \frac{3 \cdot a^2}{2} \cdot \sqrt{3}$

a	Grundlinie a	m
A	Fläche	m^2

[$A = \frac{3 \cdot a^2}{2} \cdot \sqrt{3}$][$a = \sqrt{\frac{A \cdot 2}{3 \cdot \sqrt{3}}}$][$\rho = \frac{a}{2} \cdot \sqrt{3}$][$a = \frac{\rho \cdot 2}{\sqrt{3}}$]

2.5 Kreis

2.5.1 Kreis




$d = 2 \cdot r$

r	Radius	m
d	Durchmesser	m

[$d = 2 \cdot r$][$r = \frac{d}{2}$][$A = r^2 \cdot \pi$][$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$][$U = 2 \cdot r \cdot \pi$][$r = \frac{U}{2 \cdot \pi}$]

2.5.2 Kreissektor (Grad)




$A = \frac{r^2 \cdot \pi \cdot \alpha}{360}$

α	Winkel	°	
π	Kreiszahl		$3,1415927$
r	Radius	m	
A	Fläche	m^2	

[$A = \frac{r^2 \cdot \pi \cdot \alpha}{360}$][$r = \sqrt{\frac{A \cdot 360}{\alpha \cdot \pi}}$][$\alpha = \frac{A \cdot 360}{r^2 \cdot \pi}$][$b = \frac{2 \cdot r \cdot \pi \cdot \alpha}{360}$][$r = \frac{b \cdot 360}{\alpha \cdot \pi \cdot 2}$][$\alpha = \frac{b \cdot 360}{r \cdot \pi \cdot 2}$]

2.5.3 Kreissektor (Bogenmaß)




$A = \frac{r^2 \cdot x}{2}$

x	Winkel x	rad
r	Radius	m
A	Fläche	m^2

[$A = \frac{r^2 \cdot x}{2}$][$r = \sqrt{\frac{A \cdot 2}{x}}$][$x = \frac{A \cdot 2}{r^2}$][$b = r \cdot x$][$r = \frac{b}{x}$][$x = \frac{b}{r}$]

2.5.4 Kreisring




$$A = (r_a^2 - r_i^2) \cdot \pi$$


π	Kreiszahl		$3,1415927$
r_a	Radius (äußerer Kreis)	m	
r_i	Radius (innerer Kreis)	m	
A	Fläche	m^2	

[$A = (r_a^2 - r_i^2) \cdot \pi$][$r_a = \sqrt{\frac{A}{\pi} + r_i^2}$][$r_i = \sqrt{r_a^2 - \frac{A}{\pi}}$]


2.6 Stereometrie

2.6.1 Prisma





Quadratisches Prisma




Dreiseitiges Prisma

$V = G \cdot h$

h	Körperhöhe	m
G	Grundfläche	m^2
V	Volumen	m^3

[$V = G \cdot h$][$G = \frac{V}{h}$][$h = \frac{V}{G}$][$O = 2 \cdot G + M$][$G = \frac{O-M}{2}$][$M = O - 2 \cdot G$]

2.6.2 Würfel



$V = a^3$

a	Seite	m
V	Volumen	m^3

$O = 6 \cdot a^2$


a	Seite	m
O	Oberfläche	m^2

$$d = a \cdot \sqrt{3}$$

a	Seite	m
d	Raumdiagonale	m

[$V = a^3$][$a = \sqrt[3]{V}$][$O = 6 \cdot a^2$][$a = \sqrt{\frac{O}{6}}$][$d = a \cdot \sqrt{3}$][$a = \frac{d}{\sqrt{3}}$]

2.6.3 Quader



$$V = a \cdot b \cdot c$$

c	Höhe	m
b	Breite	m
a	Länge	m
V	Volumen	m^3

$$O = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$$


c	Höhe	m
b	Breite	m
a	Länge	m
O	Oberfläche	m^2

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$


c	Höhe	m
b	Breite	m
a	Länge	m
d	Raumdiagonale	m

[$V = a \cdot b \cdot c$][$a = \frac{V}{b \cdot c}$][$b = \frac{V}{a \cdot c}$][$c = \frac{V}{b \cdot a}$][$O = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$][$a = \frac{O - 2 \cdot b \cdot c}{2 \cdot (b + c)}$][$b = \frac{O - 2 \cdot a \cdot c}{2 \cdot (a + c)}$][$c = \frac{O - 2 \cdot b \cdot a}{2 \cdot (b + a)}$][$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$][$a = \sqrt{d^2 - b^2 - c^2}$][$b = \sqrt{d^2 - a^2 - c^2}$][$c = \sqrt{d^2 - b^2 - a^2}$]

2.6.4 Pyramide



Quadratische Grundfläche



Rechteckige Grundfläche

Volumen

$V = \frac{1}{3}G \cdot h$

Körperhöhe	h	m	Meter
Grundfläche	G	m^2	Quadratmeter
Volumen	V	m^3	Kubikmeter

$G = \frac{3 \cdot V}{h}$ $h = \frac{3 \cdot V}{G}$

Oberfläche

$O = G + M$

Grundfläche	G	m^2	Quadratmeter
Mantelfläche	M	m^2	Quadratmeter
Oberfläche	O	m^2	Quadratmeter

$G = O - M$ $M = O - G$

Quadratische Pyramide

Pythagoras im $\triangle ABC$ $d^2 = a^2 + a^2$ $d = a\sqrt{2}$

Pythagoras im $\triangle LMS$ $h_1^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2$

Pythagoras im $\triangle ALS$ $s^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2 + h^2$

Mantelfläche $M = 4 \cdot \frac{1}{2} a \cdot h_1$

Grundfläche $G = a^2$

Oberfläche $O = G + M$

Volumen $V = \frac{1}{3} G \cdot h$ $V = \frac{1}{3} a^2 \cdot h$

Winkel zwischen der Seitenkante und der Grundfläche

$\sphericalangle CAS$ $\tan \eta = \frac{h}{\frac{1}{2}d}$

Winkel zwischen der Seitenfläche $\triangle BCS$ und der Grundfläche

$\sphericalangle SML$ $\tan \epsilon = \frac{h}{\frac{1}{2}a}$

Pythagoras im $\triangle ABC$ $d = \sqrt{a^2 + a^2}$

$d = \sqrt{(3m)^2 + (3m)^2} = 4,24m$

Pythagoras im $\triangle LM_1S$ $h_1 = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2}$

$h_1 = \sqrt{\left(\frac{3m}{2}\right)^2 + (5m)^2} = 5,22m$

Pythagoras im $\triangle ALS$ $s = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + h^2}$

$s = \sqrt{\left(\frac{4,24m}{2}\right)^2 + (5m)^2} = 5,43m$

Mantelfläche $M = 4 \cdot \frac{1}{2} a \cdot h_1$

$M = 4 \cdot \frac{1}{2} 3m \cdot 5,22m = 31,3m^2$

Grundfläche $G = a^2$

$G = (3m)^2 = 9m^2$

Oberfläche $O = G + M$

$O = 9m^2 + 31,3m^2 = 40,3m^3$

Volumen $V = \frac{1}{3} a^2 \cdot h$

$V = \frac{1}{3}(3m)^2 \cdot 5m = 15m^3$

$\sphericalangle CAS$ $\tan \eta = \frac{h}{\frac{1}{2}d}$

$\tan \eta = \frac{5m}{\frac{1}{2}4,24m}$

$\eta = 67°$

$\sphericalangle SM_1L$ $\tan \epsilon = \frac{h}{\frac{1}{2}a}$

$\tan \epsilon = \frac{5m}{\frac{1}{2}3m}$

$\epsilon = 73,3°$

Rechteckige Pyramide

Pythagoras im $\triangle ABC$ $d^2 = a^2 + b^2$

Pythagoras im $\triangle LM_1S$ $h_1^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2$

Pythagoras im $\triangle LM_2S$ $h_2^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2$

Pythagoras im $\triangle ALS$ $s^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2 + h^2$

Mantelfläche: $M = 2 \cdot \frac{1}{2}a \cdot h_2 + 2 \cdot \frac{1}{2}b \cdot h_1$

Grundfläche: $G = a \cdot b$

Oberfläche: $O = G + M$

Volumen: $V = \frac{1}{3}G \cdot h$ $V = \frac{1}{3}a \cdot b \cdot h$

Winkel zwischen der Seitenkante und der Grundfläche

$\measuredangle CAS$ $\tan\eta = \frac{h}{\frac{1}{2}d}$

Winkel zwischen der Seitenfläche $\triangle BCS$ und der Grundfläche

$\measuredangle SM_1L$ $\tan\epsilon = \frac{h}{\frac{1}{2}a}$

Winkel zwischen der Seitenfläche $\triangle ABC$ und der Grundfläche

$\measuredangle SM_2L$ $\tan\mu = \frac{h}{\frac{1}{2}b}$

Pythagoras im $\triangle ABC$ $d = \sqrt{a^2 + b^2}$

$d = \sqrt{(3m)^2 + (4m)^2} = 5m$

Pythagoras im $\triangle LM_1S$ $h_1 = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2}$

$h_1 = \sqrt{\left(\frac{3m}{2}\right)^2 + (5m)^2} = 5,22m$

Pythagoras im $\triangle LM_2S$ $h_2 = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2}$

$h_2 = \sqrt{\left(\frac{4m}{2}\right)^2 + (5m)^2} = 5,39m$

Pythagoras im $\triangle ALS$ $s = \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + h^2}$

$s = \sqrt{\left(\frac{5m}{2}\right)^2 + (5m)^2} = 5,59m$

Mantelfläche: $M = 2 \cdot \frac{1}{2}a \cdot h_2 + 2 \cdot \frac{1}{2}b \cdot h_1$

$M = 2 \cdot \frac{1}{2}3m \cdot 5,39m + 2 \cdot \frac{1}{2}4m \cdot 5,22m = 37m^2$

Grundfläche: $G = a \cdot b$

$G = 3m \cdot 4m = 12m^2$

Oberfläche: $O = G + M$

$O = 12m^2 + 37m^2 = 49m^3$

Volumen: $V = \frac{1}{3}a \cdot b \cdot h$

$V = \frac{1}{3}3m \cdot 4m \cdot 5m = 20m^3$

$\measuredangle CAS$ $\tan\eta = \frac{h}{\frac{1}{2}d}$

$\tan\eta = \frac{5m}{\frac{1}{2}5m}$

$\eta = 63,4^\circ$

$\measuredangle SM_1L$ $\tan\epsilon = \frac{h}{\frac{1}{2}a}$

$\tan\epsilon = \frac{5m}{\frac{1}{2}3m}$

$\epsilon = 73,3^\circ$


$\measuredangle SM_2L$ $\tan\mu = \frac{h}{\frac{1}{2}b}$

$\tan\mu = \frac{5m}{\frac{1}{2}4m}$

$\mu = 68,2^\circ$

[$V = \frac{1}{3}G \cdot h$][$G = \frac{3 \cdot V}{h}$][$h = \frac{3 \cdot V}{G}$][$O = G + M$][$G = O - M$][$M = O - G$][Rechteckige Pyramide][Quadratische Pyramide]

2.6.5 Kreiszylinder



$$V = r^2 \cdot \pi \cdot h$$


h	Körperhöhe	m	
π	Kreiszahl		$3,1415927$
r	Radius	m	
V	Volumen	m^3	

$$O = 2 \cdot r \cdot \pi \cdot (r + h)$$

h	Körperhöhe	m	
π	Kreiszahl		$3,1415927$
r	Radius	m	
O	Oberfläche	m^2	

[$V = r^2 \cdot \pi \cdot h$][$r = \sqrt{\frac{V}{\pi \cdot h}}$][$h = \frac{V}{r^2 \cdot \pi}$][$O = 2 \cdot r \cdot \pi \cdot (r + h)$][$r = 0,5 \cdot (-h + \sqrt{h^2 + \frac{O}{\pi}})$][$h = \frac{0 - 2 \cdot \pi \cdot r^2}{2 \cdot r \cdot \pi}$]

2.6.6 Hohlzylinder




$$V = (r_1^2 - r_2^2) \cdot \pi \cdot h$$

h	Körperhöhe	m	
π	Kreiszahl		$3,1415927$
r_2	Radius 2	m	
r_1	Radius 1	m	
V	Volumen	m^3	

[$V = (r_1^2 - r_2^2) \cdot \pi \cdot h$][$r_1 = \sqrt{\frac{V}{\pi \cdot h} + r_2^2}$][$r_2 = \sqrt{r_1^2 - \frac{V}{\pi \cdot h}}$][$h = \frac{V}{(r_1^2 - r_2^2) \cdot \pi}$]


2.6.7 Kreiskegel



$V = \frac{1}{3} \cdot r^2 \cdot \pi \cdot h$	h	Höhe	m
	π	Kreiszahl	$3,1415927$
	r	Radius	m
	V	Volumen	m^3
$O = r \cdot \pi \cdot (r + s)$	s	Mantellinie	m
	r	Radius	m
	π	Kreiszahl	$3,1415927$
	O	Oberfläche	m^2
$M = r \cdot \pi \cdot s$	s	Mantellinie	m
	r	Radius	m
	π	Kreiszahl	$3,1415927$
	M	Mantelfläche	m^2
$s = \sqrt{h^2 + r^2}$	s	Mantellinie	m
	r	Radius	m
	h	Höhe	m

$[\ V = \frac{1}{3} \cdot r^2 \cdot \pi \cdot h\ ][\ r = \sqrt{\frac{3 \cdot V}{\pi \cdot h}}\ ][\ h = \frac{3 \cdot V}{r^2 \cdot \pi}\ ][\ O = r \cdot \pi \cdot (r + s)\ ][\ s = \frac{O}{r \cdot \pi} - r\ ][\ r = \frac{-\pi \cdot s + \sqrt{(\pi \cdot s)^2 + 4 \cdot \pi \cdot O}}{2 \cdot \pi}\ ][\ M = r \cdot \pi \cdot s\ ][\ s = \frac{M}{r \cdot \pi}\ ][\ r = \frac{M}{s \cdot \pi}\ ][\ s = \sqrt{h^2 + r^2}\ ][\ r = \sqrt{s^2 - h^2}\ ][\ h = \sqrt{s^2 - r^2}\ ]$

2.6.8 Kegelstumpf



Kegelstumpf

Strahlensatz

$\frac{h_2}{h_1} = \frac{r_2}{r_1}$	$\frac{s_2}{s_1} = \frac{r_2}{r_1}$
$h_1 = h_2 + h$	$s_1 = s_2 + s$
$\frac{h_2}{h_2 + h} = \frac{r_2}{r_1}$	$\frac{s_2}{s_2 + s} = \frac{r_2}{r_1}$
$h_2 \cdot r_1 = r_2 \cdot (h_2 + h)$	$s_2 \cdot r_1 = r_2 \cdot (s_2 + s)$
$h_2 \cdot r_1 = r_2 \cdot h_2 + r_2 \cdot h$	$s_2 \cdot r_1 = r_2 \cdot s_2 + r_2 \cdot s$
$h_2 \cdot r_1 - r_2 \cdot h_2 = r_2 \cdot h$	$s_2 \cdot r_1 - r_2 \cdot s_2 = r_2 \cdot s$
$h_2 \cdot (r_1 - r_2) = r_2 \cdot h$	$s_2 \cdot (r_1 - r_2) = r_2 \cdot s$
$h_2 = \frac{r_2 \cdot h}{r_1 - r_2}$	$s_2 = \frac{r_2 \cdot s}{r_1 - r_2}$
$h_1 = h_2 + h$	$s_1 = s_2 + s$

Pythagoras:

$s_2^2 = r_2^2 + h_2^2 \quad s_1^2 = r_1^2 + h_1^2$

Mantelfläche: $M = r_1 \cdot \pi \cdot s_1 - r_2 \cdot \pi \cdot s_2$

Grund- und Deckfläche: $G = r_1^2\pi \quad D = r_2^2\pi$

Oberfläche: $O = G + D + M$

Volumen: $V = \frac{1}{3}r_1^2 \cdot \pi \cdot h_1 - \frac{1}{3}r_2^2 \cdot \pi \cdot h_2$

$h = 5m$

$\pi = 3,14$

$r_2 = 3m$

$r_1 = 4m$

$h_2 = \frac{r_2 \cdot h}{r_1 - r_2}$

$h_2 = \frac{3m \cdot 5m}{4m - 3m} = 15m$

$h_1 = h_2 + h$

$h_1 = 15m + 5m$

Pythagoras:

$s_2 = \sqrt{r_2^2 + h_2^2} \quad s_1 = \sqrt{r_1^2 + h_1^2}$

$s_2 = \sqrt{(3m)^2 + (15m)^2} = 15,3m$

$s_1 = \sqrt{(4m)^2 + (20m)^2} = 20,4m$

Mantelfläche: $M = r_1 \cdot \pi \cdot s_1 - r_2 \cdot \pi \cdot s_2$

$M = 4m \cdot \pi \cdot 20,4m - 3m \cdot \pi \cdot 15,3m = 112m^2$

Grund- und Deckfläche: $G = r_1^2\pi \quad D = r_2^2\pi$

$G = (4m)^2\pi = 50,3m^2$

$D = (3m)^2\pi = 28,3m^2$

Oberfläche: $O = G + D + M$

$O = 50,3m^2 + 28,3m^2 + 112m^2 = 191m^2$

Volumen: $V = \frac{1}{3}r_1^2 \cdot \pi \cdot h_1 - \frac{1}{3}r_2^2 \cdot \pi \cdot h_2$

$V = \frac{1}{3}4m^2 \cdot \pi \cdot 20m - \frac{1}{3}3m^2 \cdot \pi \cdot 15m = 194m^3$

[*Kegelstumpf*]

2.6.9 Kugel

$$V = \frac{4}{3} \cdot r^3 \cdot \pi$$

π	Kreiszahl		$3,1415927$
r	Radius	m	
V	Volumen	m^3	


$$O = 4 \cdot r^2 \cdot \pi$$

r	Radius	m	
π	Kreiszahl		$3,1415927$
O	Oberfläche	m^2	

[$V = \frac{4}{3} \cdot r^3 \cdot \pi$][$r = \sqrt[3]{\frac{V \cdot 3}{4 \cdot \pi}}$][$O = 4 \cdot r^2 \cdot \pi$][$r = \sqrt{\frac{O}{\pi \cdot 4}}$]

2.7 Trigonometrie

2.7.1 Gradmaß - Bogenmaß



$\alpha(^\circ)$	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\alpha(rad)$	0 0	$\frac{1}{6}\pi$ $0,5236$	$\frac{1}{4}\pi$ $0,7854$	$\frac{1}{3}\pi$ $1,0472$	$\frac{1}{2}\pi$ $1,5708$	$\frac{2}{3}\pi$ $2,0944$	$\frac{3}{4}\pi$ $2,3562$	$\frac{5}{6}\pi$ $2,618$	π $3,1416$

$\alpha(^\circ)$	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
$\alpha(rad)$	$\frac{7}{6}\pi$ $3,6652$	$\frac{5}{4}\pi$ $3,927$	$\frac{4}{3}\pi$ $4,1888$	$\frac{3}{2}\pi$ $4,7124$	$\frac{5}{3}\pi$ $5,236$	$\frac{7}{4}\pi$ $5,4978$	$\frac{11}{6}\pi$ $5,7596$	2π $6,2832$

Definition Bogenmaß

Das Bogenmaß des Winkels x (RAD), ist die Länge des Kreisbogens b durch Radius r.
$x = \frac{b}{r}$
Beim Radius r=1 (Einheitskreis), ist das Bogenmaß des Winkels x (RAD) die Länge des Kreisbogens b.
$x = b$

Kreisbogen:$b = 3cm$ Radius:$r = 2cm$
$x = \frac{b}{r}$
$x = \frac{3cm}{2cm}$
$x = 1,5rad$

Umrechnung Gradmaß (DEG) - Bogenmaß (RAD)

$\alpha = \frac{180}{\pi} \cdot x$
$x = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha$
Kreiszahl π
α in Gradmaß $[^\circ]$ (DEG)
x in Bogemaß $[rad]$ (RAD)


$\alpha = \frac{180}{\pi} \cdot x$
$\pi = 3,14$
$x = 1,57rad$
$\alpha = \frac{180}{\pi} \cdot 1,57rad$
$\alpha = 90^\circ$

$x = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha$
$\pi = 3,14$
$\alpha = 90^\circ$
$x = \frac{3,14}{180} \cdot 90^\circ$
$x = 1,57rad$


[$\alpha = \frac{180}{\pi} \cdot x$][$x = \frac{\pi}{180} \cdot \alpha$]

2.7.2 Definition


Sinus (sin) am Einheitskreis




Sinusfunktion $f(x) = sin(x)$




Kosinus (cos) am Einheitskreis




Kosinusfunktion $f(x) = cos(x)$



Tangens (tan) am Einheitskreis



Tangensfunktion $f(x) = tan(x)$



	P_0		P_1		P_2	P_3			P_4				P_5	P_6	P_7		P_8
α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
x	0°	$\frac{1}{6}\pi$	$\frac{1}{4}\pi$	$\frac{1}{3}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{7}{6}\pi$	$\frac{5}{4}\pi$	$\frac{4}{3}\pi$	$\frac{3}{2}\pi$	$\frac{5}{3}\pi$	$\frac{7}{4}\pi$	$\frac{11}{6}\pi$	2π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	−1	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	−1	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{1}{3}\sqrt{3}$	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	$-\sqrt{3}$	−1	$-\frac{1}{3}\sqrt{3}$	0

Trigonometrie - Einheitskreis - Funktionen

• Punkt auf dem Einheitskreis:
$P(cos\alpha/sin\alpha)$
• Trigonometrische Funktionen:
Sinusfunktion $f(x) = sin(x)$
Kosinusfunktion $f(x) = cos(x)$
Tangensfunktion $f(x) = tan(x)$
• Steigung :
$tan(\alpha) = \dfrac{sin(\alpha)}{cos(\alpha)} = m$

Punkt auf dem Einheitskreis:
$P_1(\cos 45°/\sin 45°)$ $P_1(\cos \frac{1}{4}\pi/\sin \frac{1}{4}\pi)$ $P_1(\frac{1}{2}\sqrt{2}/\frac{1}{2}\sqrt{2})$
$P_2(\cos 90°/\sin 90°)$ $P_2(\cos \frac{1}{2}\pi/\sin \frac{1}{2}\pi)$ $P_2(0/1)$
$P_5(\cos 240°/\sin 240°)$ $P_5(\cos \frac{4}{3}\pi°/\sin \frac{4}{3}\pi)$ $P_5(-\frac{1}{2}/\frac{1}{2}\sqrt{3})$
Trigonometrische Funktion:
$f(\frac{1}{4}\pi) = sin(\frac{1}{4}\pi) = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
$f(\frac{1}{4}\pi) = cos(\frac{1}{4}\pi) = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
$f(\frac{1}{4}\pi) = tan(\frac{1}{4}\pi) = 1$

Komplementwinkel

$sin(90° - \alpha) = cos(\alpha)$
$cos(90° - \alpha) = sin(\alpha)$

$sin(90° - 30°) = sin(60°) = cos(30°)$
$cos(90° - 30°) = cos(60°) = sin(30°)$

Negative Winkel


$sin(-\alpha) = -sin(\alpha)$
$cos(-\alpha) = cos(\alpha)$
$tan(-\alpha) = \frac{1}{tan(\alpha)}$

$sin(-30°) = -sin(30°)$
$cos(-30°) = cos(30°)$
$tan(-30°) = \frac{1}{tan(30°)}$

[$\sin\alpha - \cos\alpha - \tan\alpha$][$\sin\alpha = y$][$\cos\alpha = x$][$\tan\alpha = m$]


2.7.3 Quadrantenregel

I. Quadrant




$P_1(\cos 60°/\sin 60°)$

II. Quadrant




$P_2(\cos 120°/\sin 120°)$

III. Quadrant




$P_3(\cos 240°/\sin 240°)$

IV. Quadrant




$P_4(\cos 300°/\sin 300°)$

I.und III. Quadrant



II. und IV. Quadrant



	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$
I. Quadrant	+	+	+
II. Quadrant	+	-	-
III. Quadrant	-	-	+
IV. Quadrant	-	+	-

	DEG	RAD
I. Quadrant	α	x
II. Quadrant	$180° - \alpha$	$\pi - x$
III. Quadrant	$180° + \alpha$	$\pi + x$
IV. Quadrant	$360° - \alpha$	$2\pi - x$

α in Gradmaß

I. Quadrant $0° < \alpha < 90°$
$\sin(\alpha) > 0$ $\cos(\alpha) > 0$ $\tan(\alpha) > 0$
II. Quadrant $90° < \alpha_2 < 180°$
$\sin(\alpha_2) > 0$ $\cos(\alpha_2) < 0$ $\tan(\alpha_2) < 0$
$\alpha_2 = 180° - \alpha$
$sin(180° - \alpha) = sin(\alpha)$
$cos(180° - \alpha) = -cos(\alpha)$
$tan(180° - \alpha) = -tan(\alpha)$
III. Quadrant $180° < \alpha_3 < 270°$
$\sin(\alpha_3) < 0$ $\cos(\alpha_3) < 0$ $\tan(\alpha_3) > 0$
$\alpha_3 = 180° + \alpha$
$sin(180° + \alpha) = -sin(\alpha)$
$cos(180° + \alpha) = -cos(\alpha)$
$tan(180° + \alpha) = tan(\alpha)$
IV. Quadrant $270° < \alpha_4 < 360°$
$\sin(\alpha_4) < 0$ $\cos(\alpha_4) > 0$ $\tan(\alpha_4) < 0$
$\alpha_4 = 360° - \alpha$
$sin(360° - \alpha) = -sin(\alpha)$
$cos(360° - \alpha) = cos(\alpha)$
$tan(360° - \alpha) = -tan(\alpha)$

$\sin\alpha = \frac{1}{2}$
I Quadrant: $\alpha_1 = 30°$
II Quadrant: $\alpha_2 = 180° - 30° = 150°$
$\sin\alpha = -\frac{1}{2}$
III Quadrant: $\alpha_1 = 180° + 30° = 210°$
IV Quadrant: $\alpha_2 = 360° - 30° = 330°$
$\cos\alpha = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
I Quadrant: $\alpha_1 = 45°$
IV Quadrant: $\alpha_2 = 360° - 45° = 315°$
$\cos\alpha = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$
II Quadrant: $\alpha_1 = 180° - 45° = 135°$
III Quadrant: $\alpha_2 = 180° + 45° = 225°$

x in Bogenmaß

I. Quadrant $0 < x < \frac{\pi}{2}$
$\sin(x) > 0 \quad \cos(x) > 0 \quad \tan(x) > 0$
II. Quadrant $\frac{\pi}{2} < x_2 < \pi$
$\sin(x_2) > 0 \quad \cos(x_2) < 0 \quad \tan(x_2) < 0$
$x_2 = \pi - x$
$sin(\pi - x) = sin(x)$
$cos(\pi - x) = -cos(x)$
$tan(\pi - x) = -tan(x)$
III. Quadrant $\pi < x_3 < \frac{3\pi}{2}$
$\sin(x_3) < 0 \quad \cos(x_3) < 0 \quad \tan(x_3) > 0$
$x_3 = \pi + x$
$sin(\pi + x) = -sin(x)$
$cos(\pi + x) = -cos(x)$
$tan(\pi + x) = tan(x)$
IV. Quadrant $\frac{3\pi}{2} < x_4 < 2\pi$
$\sin(x_4) < 0 \quad \cos(x_4) > 0 \quad \tan(x_4) < 0$
$x_4 = 2\pi - x$
$sin(2\pi - x) = -sin(x)$
$cos(2\pi - x) = cos(x)$
$tan(2\pi - x) = -tan(x)$

$\sin x = \frac{1}{2}$
I Quadrant: $x_1 = \frac{1}{6}\pi$
II Quadrant: $x_2 = \pi - \frac{1}{6}\pi = \frac{5}{6}\pi$
$\sin \alpha = -\frac{1}{2}$
III Quadrant: $x_1 = \pi + \frac{1}{6}\pi = \frac{7}{6}\pi$
IV Quadrant: $x_1 = 2\pi - \frac{1}{6}\pi = \frac{11}{6}\pi$

$\cos x = \frac{1}{2}\sqrt{2}$
I Quadrant: $x_1 = \frac{1}{4}\pi$
IV Quadrant: $x_2 = 2\pi - \frac{1}{4}\pi = \frac{7}{4}\pi$

$\cos \alpha = -\frac{1}{2}\sqrt{2}$
II Quadrant: $x_1 = \pi - \frac{1}{4}\pi = \frac{1}{4}\pi$
III Quadrant: $x_2 = pi + \frac{1}{4}\pi = \frac{5}{4}\pi$

[$\sin\alpha - \cos\alpha - \tan\alpha$][$\sin\alpha = y$][$\cos\alpha = x$][$\tan\alpha = m$]

2.7.4 Umrechnungen

tan - sin - cos

$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$
$\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha$
$\cos\alpha = \frac{\sin\alpha}{\tan\alpha}$

$\sin 60° = \frac{1}{2}\sqrt{3}$
$\cos 60° = \frac{1}{2}$
$\tan 60° = \frac{\sin 60°}{\cos 60°}$
$\tan 60° = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}}$
$\tan 60° = \sqrt{3}$
$\tan 60° = 1,73$

sin - cos

$sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$
$sin\alpha = \sqrt{1 - cos^2\alpha}$
$cos\alpha = \sqrt{1 - sin^2\alpha}$

$\cos 30° = \frac{1}{2}\sqrt{3}$
$\sin 30° = \sqrt{1 - \cos^2 30°}$
$\sin 30° = \sqrt{1 - (\frac{1}{2}\sqrt{3})^2}$
$\sin 30° = \sqrt{\frac{1}{4}}$
$\sin\alpha = \frac{1}{2}$


Additionstheoreme

$$sin(\alpha+\beta) = sin\alpha \cdot cos\beta + cos\alpha \cdot sin\beta$$
$$sin(\alpha-\beta) = sin\alpha \cdot cos\beta - cos\alpha \cdot sin\beta$$
$$cos(\alpha+\beta) = cos\alpha \cdot cos\beta - sin\alpha \cdot sin\beta$$
$$cos(\alpha-\beta) = cos\alpha \cdot cos\beta + sin\alpha \cdot sin\beta$$
$$tan(\alpha+\beta) = \frac{tan\alpha+tan\beta}{1-tan\alpha \cdot tan\beta}$$
$$tan(\alpha-\beta) = \frac{tan\alpha-tan\beta}{1+tan\alpha \cdot tan\beta}$$
$$sin2\alpha = 2 \cdot sin\alpha \cdot cos\alpha$$
$$cos2\alpha = 2 \cdot cos^2\alpha - 1 = cos^2\alpha - sin^2\alpha$$
$$tan2\alpha = \frac{2 \cdot tan\alpha}{1-tan^2\alpha}$$

$$sin(\alpha+30°) = sin\alpha \cdot cos30° + cos\alpha \cdot sin30°$$
$$sin(\alpha+30°) = \frac{1}{2}\sqrt{3}\sin\alpha + \frac{1}{2}\cos\alpha$$

[$sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$][$sin\alpha = \sqrt{1-cos^2\alpha}$][$cos\alpha = \sqrt{1-sin^2\alpha}$][$tan\alpha = \frac{sin\alpha}{cos\alpha}$][$sin\alpha = tan\alpha \cdot cos\alpha$][$cos\alpha = \frac{sin\alpha}{tan\alpha}$]

2.7.5 Rechtwinkliges Dreieck



$$sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad sin\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$$

c	Hypotenuse	m
a	Gegenkathete zu α	m
α	Winkel	°

$$cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad cos\alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$$


c	Hypotenuse	m
b	Ankathete zu α	m
α	Winkel	°

$$tan\alpha = \frac{a}{b} \qquad tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$

b	Ankathete zu α	m
a	Gegenkathete zu α	m
α	Winkel	°

[$sin\alpha = \frac{a}{c}$][$a = sin\alpha \cdot c$][$c = \frac{a}{sin\alpha}$][$cos\alpha = \frac{b}{c}$][$b = cos\alpha \cdot c$][$c = \frac{b}{cos\alpha}$][$tan\alpha = \frac{a}{b}$][$a = tan\alpha \cdot b$][$b = \frac{a}{tan\alpha}$]

2.7.6 Sinussatz




$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$$
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} \qquad / \cdot \sin\beta \qquad / \cdot \sin\alpha$$
$$a \cdot \sin\beta = b \cdot \sin\alpha \qquad / : b$$
$$\sin\alpha = \frac{a \cdot \sin\beta}{b}$$
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$$
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} \qquad / \cdot \sin\alpha$$
$$a = \frac{b \cdot \sin\alpha}{\sin\beta}$$
$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{c}{\sin\gamma}$$
$$\frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

$$\sin\alpha = \frac{a \cdot \sin\beta}{b} \qquad \sin\alpha = \frac{a \cdot \sin\gamma}{c}$$
$$\sin\beta = \frac{b \cdot \sin\alpha}{a} \qquad \sin\beta = \frac{b \cdot \sin\gamma}{c}$$
$$\sin\gamma = \frac{c \cdot \sin\alpha}{a} \qquad \sin\gamma = \frac{c \cdot \sin\beta}{b}$$
$$a = \frac{b \cdot \sin\alpha}{\sin\beta} \qquad a = \frac{c \cdot \sin\alpha}{\sin\gamma}$$
$$b = \frac{a \cdot \sin\beta}{\sin\alpha} \qquad b = \frac{c \cdot \sin\beta}{\sin\gamma}$$
$$c = \frac{a \cdot \sin\gamma}{\sin\alpha} \qquad c = \frac{b \cdot \sin\gamma}{\sin\beta}$$

[$\frac{a}{sin\alpha} = \frac{b}{sin\beta} = \frac{c}{sin\gamma}$][$a = \frac{b \cdot sin\alpha}{sin\beta}$][$sin\alpha = \frac{a \cdot sin\beta}{b}$]

2.7.7 Kosinussatz



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$$
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha \qquad / - a^2$$
$$0 = b^2 + c^2 - a^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha \qquad / + 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$$
$$2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha = b^2 + c^2 - a^2 \qquad / : (2 \cdot b \cdot c)$$
$$\cos\alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot c}$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos\beta$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha} \qquad \cos\alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot c}$$
$$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos\beta} \qquad \cos\beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot a \cdot c}$$
$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma} \qquad \cos\gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \cdot a \cdot b}$$

[$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot cos\alpha$][$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot cos\alpha}$][$cos\alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot c}$]

2.7.8 Kongruenzsätze - Berechnungen am Dreieck

Seite - Seite - Seite (SSS)

Seite	Seite	Seite
a	b	c

1. Zwei Winkel mit Kosinussatz berechnen

$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$

$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha \quad / - a^2 \quad / + 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$

$2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha = b^2 + c^2 - a^2 \quad / : (2 \cdot b \cdot c)$


$\cos\alpha = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot c}$

entsprechend

$\cos\beta = \dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot a \cdot c} \qquad \cos\gamma = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \cdot a \cdot b}$

2. Fehlenden Winkel über die Winkelsumme im Dreieck berechnen

$\alpha + \beta + \gamma = 180°$



$a = 2,2 \quad b = 3,6 \quad c = 4$

$\cos\alpha = \dfrac{3,6^2 + 4^2 - 2,2^2}{2 \cdot 3,6 \cdot 4}$

$\cos\alpha = 0,8$

$\alpha = \arccos(0,8)$

$\alpha = 33,1°$

$\cos\beta = \dfrac{2,2^2 + 4^2 - 3,6^2}{2 \cdot 2,2 \cdot 4}$

$\cos\beta = 0,4$

$\beta = \arccos(0,4)$

$\beta = 63,4°$

$\gamma = 180° - 33,1° - 63,4°$

$\gamma = 83,5°$

Seite - Winkel - Seite (SWS)

Seite	Winkel	Seite
a	β	c
a	γ	b
b	α	c

1. Gegenüberliegende Seite mit Kosinussatz berechnen

$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\beta$

$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha}$

entsprechend

$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos\beta} \qquad c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma}$

2. Winkel mit Kosinussatz berechnen

$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$

$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha \quad / - a^2 \quad / + 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$

$2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha = b^2 + c^2 - a^2 \quad / : (2 \cdot b \cdot c)$


$\cos\alpha = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \cdot b \cdot c}$

entsprechend

$\cos\beta = \dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot a \cdot c} \qquad \cos\gamma = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \cdot a \cdot b}$

3. Fehlenden Winkel über die Winkelsumme im Dreieck berechnen

$\alpha + \beta + \gamma = 180°$



$a = 2,2 \quad c = 4 \quad \beta = 63,4°$

$b = \sqrt{2,2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2,2 \cdot 4 \cdot \cos 63,4°}$

$b = 3,6$

$\cos\alpha = \dfrac{3,6^2 + 4^2 - 2,2^2}{2 \cdot 3,6 \cdot 4}$

$\cos\alpha = 0,8$

$\alpha = \arccos(0,8)$

$\alpha = 33,1°$

$\gamma = 180° - 33,1° - 63,4°$

$\gamma = 83,5°$

Winkel - Seite - Winkel (WSW,WWS)

Winkel	Seite	Winkel
α	c	β
α	b	γ
β	a	γ

Winkel	Winkel	Seite
α	β	a
α	β	b
α	γ	a
α	γ	c
β	γ	b
β	γ	c

1. Fehlenden Winkel über die Winkelsumme im Dreieck berechnen

$$\alpha + \beta + \gamma = 180°$$

2. Eine Seite über den Sinussatz berechnen

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$$

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} \qquad / \cdot \sin\beta$$

$$b = \frac{a \cdot \sin\beta}{\sin\alpha}$$

entsprechend

$$b = \frac{c \cdot \sin\beta}{\sin\gamma}$$

$$c = \frac{a \cdot \sin\gamma}{\sin\alpha} \qquad c = \frac{b \cdot \sin\gamma}{\sin\beta}$$

$$a = \frac{b \cdot \sin\alpha}{\sin\beta} \qquad a = \frac{c \cdot \sin\alpha}{\sin\gamma}$$


3. Fehlende Seite mit dem Kosinussatz berechnen

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha}$$

entsprechend

$$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos\beta} \qquad c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma}$$



$a = 2,2 \quad \alpha = 33,1° \quad \beta = 63,4°$

$\gamma = 180° - \alpha - \beta$

$\gamma = 180° - 33,1° - 63,4°$

$\gamma = 83,5°$

$$b = \frac{2,2 \cdot \sin 63,4}{\sin 33,1}$$

$b = 3,6$

$$c = \sqrt{2,2^2 + 3,6^2 - 2 \cdot 2,2 \cdot 3,6 \cdot \cos 83,5°}$$

$c = 4$

Seite - Seite - Winkel (SsW)

Seite	Seite	Winkel	
a	b	α	a>b
a	b	β	b>a
a	c	α	a>c
a	c	γ	c>a
b	c	β	b>c
b	c	γ	c>b

1. Winkel mit dem Sinussatz berechnen

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta}$$

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} \qquad / \cdot \sin\beta \qquad / \cdot \sin\alpha$$

$$a \cdot \sin\beta = b \cdot \sin\alpha \qquad / : b$$

$$\sin\alpha = \frac{a \cdot \sin\beta}{b}$$

entsprechend

$$\sin\beta = \frac{b \cdot \sin\alpha}{a} \qquad \sin\gamma = \frac{c \cdot \sin\alpha}{a}$$

2. Fehlenden Winkel über die Winkelsumme im Dreieck berechnen


$$\alpha + \beta + \gamma = 180°$$

3. Fehlende Seite mit dem Kosinussatz berechnen

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha \qquad a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos\alpha}$$

entsprechend

$$b = \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos\beta} \qquad c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos\gamma}$$



$a = 2,2 \quad b = 3,6 \quad \beta = 63,4°$

$$\sin\alpha = \frac{2,2 \cdot \sin 63,4°}{3,6}$$

$$\sin\alpha = 0,5$$

$$\alpha = \arcsin(0,5)$$

$$\alpha = 33,1°$$

$$\gamma = 180° - 33,1° - 63,4°$$

$$\gamma = 83,5°$$

$$c = \sqrt{2,2^2 + 3,6^2 - 2 \cdot 2,2 \cdot 3,6 \cdot \cos 83,5°}$$

$$c = 4$$

[hier klicken]